

BETADINE OLDAT

Bőr- és nyálkahártya fertőtlenítőszer

A Betadine oldat széles antimikrobiális spektrummal rendelkező fertőtlenítőszer készítmény, mely bőr- és nyálkahártya fertőtlenítésre alkalmas.

A készítmény 10 mg/ml szabad aktív jódot, mint dezinficiens hatóanyagot tartalmaz.

Antimikrobiális spektrum:

baktericid, fungicid, szelektív virucid, protocid.

Toxikológiai minősítés:

Méregérősségi osztály:

"Gyakorlatilag nem mérgező" (M-IV.)

Veszélyességi osztály:

"Gyakorlatilag nem veszélyes" (V.-D.)

Alkalmazási terület:

injekciózás, vérvétel, punkciók, biopsziák, transzfúziók, infúziók előtt a bőrfelület fertőtlenítésére;

műtétek előtt a bőrfelület és a nyálkahártyák fertőtlenítésére;

aszeptikus sebkezelésre;

bakteriális és gombás bőrfertőzéseknel;

műtetre kerülő betegek teljes vagy részleges személyi fertőtlenítésére (ún. fertőtlenítő fürdetésre).

Ellenjavallat:

Jódérzékenység, hyperthyreosis, pajzsmirigy adenoma, dermatitis, veseelégtelenség esetén, radioaktív jód-kezelés előtt, pajzsmirigy terapeutikumok alkalmazásakor.

Koraszülöttek, újszülöttek és csecsemők kezelése, valamint a terhesség 3. hónapjától és szoptatás alatt alkalmazása kerülendő és csak egyéni mérlegelés alapján jöhet szóba, állandó orvosi ellenőrzés mellett!

Alkalmazása:

A Betadine oldatot töményen (hígítatlanul), vagy 10%-os (1:10 arányú), illetve 1%-os (1:100 arányú) vizes hígítású oldatban alkalmazzuk a felhasználási területtől függően:

injekciózás, punkció, vérvétel, transzfúzió, infúzió, biopszia előtt, műtéti bőrfelület fertőtlenítésére ép bőrfelületen alkalmazva: töményen (hígítatlanul) kell használni, a felvitel után legalább 1-2 perces expozíciós idő mellett. Aszeptikus sebkezelésnél, égett bőrfelület kezelésére, nyálkahártya fertőtlenítésre, bakteriális és gombás bőrfertőzéseknel: 10%-os (1:10 arányban hígított) vízzel hígított Betadine oldatot kell alkalmazni.

műtét előtti betegfürdetésnél: a Betadine oldatot 1%-os (1:100 arányú hígításban) koncentrációban kell alkalmazni a beteg fertőtlenítő fürdetéséhez. Legcélszerűbb a hígított Betadine oldattal a testfelület egyenletesen bekenni, majd legalább 2 perces behatási idő után langyos vízzel leöblíteni.

A Betadine oldatból a hígításokat mindig a felhasználás előtt, frissen kell elkészíteni.

A hígított oldatot tárolni nem szabad!

A Betadine oldat a textíliából langyos vízzel, erősebb szennyeződés esetén Na-tioszulfát oldattal (fixírsó oldat) eltávolítható.

Figyelmeztetés:

A Betadine oldat sötétbarna színe annak hatásosságára utal.

A halványodó szín a csökkenő antimikrobiális hatást is jelzi.

Az oldat bomlását a fény és a 40 °C feletti hőmérséklet is előregíti.

A Betadine oldat 2-7 pH érték között rendelkezik antimikrobiális hatással.

A készítmény nem alkalmazható együtt enzimatikus sebkenőcsökkel, valamint higany-tartalmú fertőtlenítőszerrel.

A Betadine oldat PVP-jódkomplexe inkompatibilis redukáló anyagokkal, alkaloid sókkal és savasan reagáló anyagokkal.

Tárolhatóság:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, fénytől védve, száraz, hűvös helyen 3 évig tárolható.

Csomagolás:

30 ml, 120 ml, és 1000 ml-es zöld színű csepegtető polietilén flakon.

Engedélyszám: 10091/1990

EGIS dok. szám: 4719/1