

1. Milyen típusú gyógyszer az Afrin Comfort orrspray és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Ön gyógyszerének a teljes neve:

Afrin Comfort original 0,5 mg/ml oldatos orrspray

Afrin Comfort mentollal 0,5 mg/ml oldatos orrspray

Afrin Comfort glicerinnel 0,5 mg/ml oldatos orrspray

Anfrin Comfort kamillával 0.5 mg/ml oldatos orrspray

Milyen típusú gyógyszer az Afrin Comfort orrspray?

Az Afrin Comfort orrspray hatóanyaga az oximetazolin-hidroklorid.

Hogyan hat az Afrin Comfort orrspray?

Az Afrin Comfort orrspray az orrnyálkahártya duzzanatát csökkentő gyógyszer, amely hatását az orrban lévő erek összehúzásán keresztül fejti ki. Alkalmazást követően már néhány percen belül hat és hatása órákon keresztül tart.

Mikor kell alkalmazni az Afrin Comfort orrspray-t

Az Afrin Comfort orrspray enyhíti a szénanáthával, megfázással és orrmelléküreg-gyulladással összefüggő orrdugulás tüneteit. 12 óránként alkalmazható.

Értesítse kezelőorvosát, ha tünetei 7 nap elteltével nem javulnak vagy súlyosbodnak.

2. Tudnivalók az Afrin alkalmazása előtt

Ne alkalmazza az Afrin Comfort orrsprayt:

- ha allergiás az oximetazolin-hidrokloridra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- ha monoaminoxidáz-gátlókat (MAO-gátlók, a Parkinson-kór és a depresszió kezelésére használt szerek) szed. A MAO-gátlók növelhetik az oximetazolin vérnyomásemelő hatásait.
- ha szűzkugú glaukómája (zöld hályog) van.
- ha az agyalapi mirigy eltávolítását az orrüregen és ékcsonton keresztül végezték (transzszfenoidális hipofizektómia).
- ha gyulladt az orrüregének a bőre és a nyálkahártyája, vagy száraz orrnyálkahártya-gyulladása van (szárazságérzés és pörkösödés orrbemenetben).
- ha heveny szívkoszorúér-betegsége vagy szív eredetű asztmája van (keringési eredetű nehézlégzés).

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az Afrin Comfort orrspray alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, ha Önnek:

- szívkoszorúér-betegedése,

- magas vérnyomása,
- pajzsmirigy-túlműködése,
- cukorbetegsége,
- prosztatata-megnagyobbodás miatt vizeletürítési nehézségei vannak.
- Az Afrin Comfort orrspray hosszabb időn keresztül alkalmazva orrdugulást okozhat. Nem ajánlott egy hétnél hosszabb ideig alkalmazni. Értesítse kezelőorvosát, ha tünetei súlyosbodnak vagy nem javulnak 7 nap után.

- Gyermek

- Az Afrin Comfort orrsprayt tilos 6 évesnél fiatalabb gyermekeknél alkalmazni (lásd 3. pont "Hogyan kell alkalmazni az Afrin Comfort orrsprayt?").

- Egyéb gyógyszerek és az Afrin Comfort orrspray

- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a nővért a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.
- Az oximetazolin vérnyomásemelő hatásai felerősödhetnek, ha együtt alkalmazzák:
- bizonyos típusú antidepresszánsokkal: triciklikus antidepresszánsok, maprotilin, monoaminoxidáz-gátlók (MAO-gátlók).

Terhesség és szoptatás

Terhesség

Az oximetazolint nem hozták összefüggésbe a terhesség kedvezőtlen kimenetelével. Az Afrin Comfort orrsprayt terhességben csak az előírásnak megfelelően szabad alkalmazni. Elővigyázatossággal alkalmazandó magasvérnyomásban szenvedő betegeknél, vagy ha a csökkent méhlepény-átáramlás jelei mutatkoznak. Gyakori vagy hosszú időn át alkalmazott nagy adagok csökkenthetik a méhlepény-átáramlást.

Szoptatás

Nem ismert, hogy az oximetazolin kiválasztódik-e az anyatejbe. Tekintettel arra, hogy az oximetazolin szoptatás alatt történő alkalmazásáról nem állnak rendelkezésre adatok, az Afrin Comfort orrspray alkalmazása ellenjavallt szoptatás alatt.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nem figyeltek meg a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre kifejtett hatásokat.

Az Afrin Comfort orrspray benzalkónium-kloridot, valamint az Afrin Comfort mentollal és az Afrin Comfort kamillával propilénglikolt is tartalmaz.

- A benzalkónium-klorid (egy tartósítószer) bőrirritáló hatású és bőrreakciókat okozhat.

- A propilénglikol bőrirritációt okozhat.

3. Hogyan kell alkalmazni az Afrin Comfort orrsprayt?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Adagolás

Felnőttek és 10 évnél idősebb gyermekek: 1-2 befújás mindkét orrnyílásba, 12 óránként.

6-10 év közötti gyermekek: 1 befújás mindkét orrnyílásba, 12 óránként.

24 óra alatt nem szabad 8 befújásnál többet alkalmazni felnőtteknél (4 befújásnál többet gyermekeknél).

Ne lépje túl az ajánlott adagot.

Az Afrin Comfort orrsprayt nem szabad orvosi javaslat nélkül 7 napnál tovább használni. Ismételt alkalmazása előtt néhány napos szünetet kell tartani.

Alkalmazás

Használat előtt felrázandó. Első alkalmazás előtt a pumpa többszöri lenyomásával légtelenítse az egységet, amíg az első teljes permet meg nem jelenik. Az orrspray tartályát függőlegesen tartva, annak fúvókáját egyik, majd másik orrnyílásba illesztve, belégzés közben 1- vagy 2-szer erősen nyomja le.

Használat után törölje tisztára. Egyazon tartály több, mint egy személy általi alkalmazása fertőzés terjedéséhez vezethet.

Ha az előírtnál több Afrin Comfort orrspray-t alkalmazott

Ha az előírtnál több Afrin Comfort orrsprayt alkalmazott, értesítse kezelőorvosát vagy azonnal menjen be a kórházba és vigye magával a tartályt.

Ha elfelejtette alkalmazni az Afrin Comfort orrsprayt

Ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A lehetséges mellékhatások a következők:

Nem gyakori (100 betegből legfeljebb 1-et érinthet): tüsszögés, szárazság vagy irritáció az orrban, szájüregben vagy torokban és orrdugulás.

Ritka (1000 betegből legfeljebb 1-et érinthet): szorongás, fáradtság, ingerlékenység, alvászavarok gyermekeknél, szapora szívverés, szívdobogásérzés, emelkedett vérnyomás, az orrnyálkahártya megduzzadása, fejfájás, hányinger, arcpír, bőrkiütés és látászavarok.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V. függelékben található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell az Afrin Comfort orrsprayt tárolni?

- A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
- Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. Hűtőszekrényben nem tárolható! Nem fagyasztható!
- A tartályon feltüntetett lejárati idő (EXP:) után ne alkalmazza az Afrin Comfort orrsprayt. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.
- Az első felbontástól számított 30 napig használható.
- Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz az Afrin Comfort orrspray?

Afrin Comfort original 0,5 mg/ml oldatos orrspray

- A készítmény hatóanyaga: Egy milliliterben 0,5 mg oximetazolin-hidroklorid van.
- Egyéb összetevők: dinátrium-edetát, vízmentes dinátrium-foszfát, monobázisos nátrium-foszfát-monohidrát, povidon K29-32, benzalkónium-klorid, makrogol 1450, tisztított víz, benzil-alkohol, mikrokristályos cellulóz és karmellóz-nátrium, citrom ízesítés, mely természetes- és mesterséges aromákat, alkoholt és DL-alfa-tokoferolt tartalmaz.

Afrin Comfort mentollal 0,5 mg/ml oldatos orrspray

- A készítmény hatóanyaga: Egy milliliterben 0,5 mg oximetazolin-hidroklorid van
- Egyéb összetevők: dinátrium-edetát, vízmentes dinátrium-foszfát, monobázisos nátrium-foszfát-monohidrát, povidon K29-32, benzalkónium-

klorid, makrogol 1450, propilénglikol, tisztított víz, benzil-alkohol, mikrokristályos cellulóz és karmellóz-nátrium, cineol, kámfor, levomentol.

- Afrin Comfort glicerinnel 0,5 mg/ml oldatos orrspray

- A készítmény hatóanyaga: Egy milliliterben 0,5 mg oximetazolin-hidroklorid van.

- Egyéb összetevők: dinátrium-edetát, vízmentes dinátrium-foszfát, monobázisos nátrium-foszfát-monohidrát, povidon K29-32, benzalkónium-klorid, makrogol 1450, tisztított víz, benzil-alkohol, mikrokristályos cellulóz és karmellóz-nátrium, glicerin, citrom ízesítés, mely természetes- és mesterséges aromákat, alkoholt és DL-alfa-tokoferolt tartalmaz.

- Afrin Comfort kamillával 0,5 mg/ml oldatos orrspray

- A készítmény hatóanyaga: Egy milliliterben 0,5 mg oximetazolin-hidroklorid van.

- Egyéb összetevők: dinátrium-edetát, vízmentes dinátrium-foszfát, monobázisos nátrium-foszfát-monohidrát, povidon K29-32, benzalkónium-klorid, makrogol 1450, tisztított víz, benzil-alkohol, mikrokristályos cellulóz és karmellóz-nátrium, glicerin, kamilla ízesítés, mely természetes- és mesterséges aromákat, propilénglikolt és kukorica szirupot tartalmaz.

Milyen az Afrin Comfort orrspray külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Az Afrin Comfort orrspray egy zselészerű, fehér vagy piszkosfehér oldat fehér, fényt át nem eresztő, 15 ml űrtartalmú, nagysűrűségű műanyag tartályban, fehér műanyag pumpával.