

1. Milyen típusú gyógyszer az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta tartalmaz:

- acetilszalicilsavat, amely láz- és fájdalomcsillapító
- aszkorbinsavat, más néven C vitamint
- Az Aspirin Plus C Forte a következő esetekben alkalmazható:
- enyhe és középerős fájdalmak, mint például fejfájás, fogfájás és menstruációs fájdalom, tüneteinek enyhítésére
- megfázásos és influenza-szerű tünetek esetén a fájdalom- és láz enyhítésére.

Az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát felnőttek és 12 évnél idősebb serdülők alkalmazhatják.

2. Tudnivalók az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta alkalmazása előtt

Ne alkalmazza az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát:

- ha Ön allergiás
- az acetilszalicilsavra, az aszkorbinsavra, vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére, vagy
- más nem-szteroid gyulladáscsökkentőkre (NSAID), amely készítményeket fájdalom, láz és gyulladás kezelésére használnak.
- ha ismert, hogy túl sok hízósejtje van (korábban fennálló masztocitózis). Az acetilszalicilsav súlyos túlérzékenységi reakciókat válthat ki (többek között kipirulással kísért keringés-összeomlást, alacsony vérnyomást, szapora szívverést és hányást).
- ha korábban szalicilátok vagy más hasonló készítmények asztmás rohamot váltottak ki Önnél (különös tekintettel a más nem szteroid gyulladáscsökkentőkre, fájdalom- és lázcsillapító készítményekre)
- a terhesség 3. trimeszterében (ha Ön a terhessége 24. hetét betöltötte)
- ha gyomor- vagy nyombél fekélye van,
- ha súlyosan beszűkült máj- vagy vesefunkciója van
- ha súlyos kezeletlen szívkárosodása van
- ha metotrexát kezelésben részesül 15 mg/hét mennyiséget meghaladó adagban
- ha szájon át alkalmazott véralvadásgátló gyógyszert (orális antikoaguláns) szed és korábban gyomor-vagy bélfekélye volt

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével

- ha más acetilszalicilsav tartalmú gyógyszerekkel együtt szedi a

készítményt, hogy elkerülje a túladagolás veszélyét

- ha fejfájása van tartós, nagy dózisú fájdalomcsillapítók alkalmazása esetén. Ne emelje az adagot, inkább forduljon kezelőorvosához, vagy gyógyszerészéhez!

- ha rendszeresen szed fájdalomcsillapítókat, különös tekintettel a kombinált fájdalomcsillapító készítményekre. Ezek használata vesekárosodáshoz és a vesefunkció csökkenéséhez vezethet.

- ha korábban gyomor- és nyombélfekélye, vagy gyulladós gyomorbántalma (gasztritisz) volt.

- ha jelenleg vérhígító, a vér alvadását gátló gyógyszereket szed (antikoagulánsok).

- Azonnal hagyja abba az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta alkalmazását és forduljon kezelőorvosához, ha Önnél gyomor- vagy bélvérzés, vagy fekély jelentkezik! Ennek tünetei a száj vérzése, véres széklet és a széklet feketés elszíneződése.

- ha csökkent veseműködése van, vagy szív- és keringési rendellenesség áll fenn Önnél, mint például vese-, érbetegség, szívkárosodás, jelentős műtéti vagy vérzéses esemény.

- Az acetilszalicilsav szedése tovább ronthatja a vesefunkciót, egészen az akut veseelégtelenség kialakulásáig. Ne alkalmazza az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát, amennyiben súlyos vese- vagy kezeletlen szívkárosodásban szenved!

- ha csökkent a májműködése.

- Ne szedje az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát, ha súlyos májkárosodásban szenved!

- ha erős menstruációs vérzése van (a menstruációs vér mennyisége és a menstruáció időtartama megnőhet).

- ha sebészeti beavatkozások előtt áll.

- Az acetilszalicilsav fokozott vérzékenységi kockázatot okoz, amely még nagyon alacsony dózisban és akár napokkal a bevételt követően is fennáll. Műtéti beavatkozás előtt beszéljen kezelőorvosával, sebészorvosával, altatóorvosával vagy fogorvosával, még akkor is, ha a beavatkozás kisebb (pl. foghúzás).

- Az acetilszalicilsav gátolja a húgysav kiválasztását. Ez köszvényes rohamot válthat ki, ha a húgysav-kiválasztása már eleve alacsony.

- ha glükóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) hiányban szenved: ez egy, a vörösvértesteket érintő örökletes megbetegedés. Az acetilszalicilsavat orvosi felügyelet mellett kell alkalmazni!

- ha fokozott oxalát kiválasztást detektáltak vizeletében (hiperoxalúriában szenved), hajlamos kalcium-oxalát típusú vesekövek kialakulására vagy visszatérő vesekövei vannak

- vas túladagolásban, vagy a vasfelhasználás zavara esetén (talasszémia, hemokromatózis).
- ha Ön asztmás.

Ne alkalmazza ezt a gyógyszert, ha 2. pont 3. bekezdése "Ne alkalmazza az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát" vonatkozik Önre. Az acetilszalicilsav a tüdő hörgőinek görcsét és asztmás rohamot, vagy egyéb túlérzékenységi reakciókat válthat ki. A rizikófaktorok a következők:

- korábbi asztma
- szénanátha
- orrpolip, elhúzódó (krónikus) légzőszervi megbetegedés vagy
- allergiás reakciók, például a bőrön (pl. viszketés, csalánkiütés)
- Szoptatás alatt nem ajánlott a készítmény alkalmazása.

Gyermekek és serdülők

Reye szindróma, egy nagyon ritka idegrendszeri tünetekkel és májkárosodással járó életveszélyes betegség kialakulását figyelték meg vírusos megbetegedésre (főleg influenza és bányahimlő) acetilszalicilsavat szedő gyermekek esetén. Ennek következtében:

- az acetilszalicilsavat gyermekeknél és serdülőknél ilyen esetekben csak orvosi utasításra és akkor lehet alkalmazni, ha más terápiás lehetőségek nem hoztak eredményt.
 - amennyiben szédülés vagy ájulás, rendellenes viselkedés vagy hányás jelentkezne, hagyja abba a kezelést és azonnal tájékoztassa kezelőorvosát!
- A szalicilátok alkalmazása a bányahimlő vírus elleni oltás beadását követő 6 hétig kerülendő.

Egyéb gyógyszerek és az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Ne alkalmazza az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát, ha a következő kezelések valamelyikében részesül:

- **15 mg/hét vagy magasabb dózisú metotrexát kezelés:** egy súlyos ízületi gyulladás, a rák és a bőr elváltozásával járó pikkelysömör (pszoriázis) kezelésére használt gyógyszer.

A metotrexát toxicitása emelkedik.

- **a vér alvadását gátló gyógyszereket szed** (szájon át adható antikoagulánsok) és korábban gyomor- és nyombélfekélye volt
- A vérzések kockázata emelkedik.

Beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével mielőtt alkalmazná az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát, **ha a következő gyógyszerek bármelyikét szedi:**

Nem ajánlott kombinációk

- **a vér alvadását gátló gyógyszereket szed** (szájon át adható antikoagulánsok) és korábban nem volt gyomor- vagy nyombélfekélye
 - A vérzések kockázata emelkedik.
 - **klopidogrel** (kivéve ezen kombináció jóváhagyott indikációját) és **tiklopidin**: a vérrögök kialakulását gátló gyógyszerek
 - A vérzések kockázata emelkedhet.
 - fájdalom, láz és gyulladás kezelésére használt, ún. **Nem-szteroid gyulladáscsökkentők** csoportjába tartozó gyógyszerek
 - A gyomor- vagy nyombélfekélyek és vérzések kialakulásának kockázata emelkedik.
 - **heparinok** a terápiás dózisban alkalmazva (pl. érben kialakult vérrög) vagy az alkalmazott dózistól függetlenül 65 évesnél idősebb betegek esetében
 - A vérzések kockázata emelkedik. Ilyen esetekben más fájdalom- vagy lázcsillapító készítmény használata javasolt.
 - **benzbromaron, probenecid**: a köszvény kezelésére alkalmazott húgysav-ürítő szerek
- Ezen gyógyszerek hatása csökken.

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható kombinációk:

- **15 mg/hétnél alacsonyabb dózisú metotrexát kezelés**
- A metotrexát toxicitása emelkedik. Csökkent vesefunkciójú és 65 évesnél idősebb betegek esetében fokozott megfigyelés javasolt. Lásd továbbá az első bekezdés első szakaszát "Egyéb gyógyszerek és az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta".
- **a vizeletkiválasztást fokozó gyógyszerek (diuretikumok) és a magas vérnyomás és egyéb szívbetegségek kezelésére** használt készítmények "pril" vagy "szartán"-ra végződő hatóanyagnevekkel (angiotenzin konvertáz enzim (ACE) gátlók, angiotenzin II receptor antagonisták)
- A vesefunkció gyors romlása következhet be kiszáradt betegekben. Továbbá a vérnyomás csökkenése következhet be.
- **klopidogrel (ezen kombináció jóváhagyott indikációjában):** a vérrögök kialakulását gátló gyógyszer
- A vérzések kockázata emelkedik.
- **a gyomor- és bélműködésre helyileg ható gyógyszerek, a gyomorsavat semlegesítő vagy savlekötő** (antacid) készítmények, vagy **orvosi szén**, hasmenés és akut mérgezés esetén használt készítmények
- Szedje ezeket a gyomorra vagy bélre ható gyógyszereket legalább 2 óra eltéréssel az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta bevitelétől!
- **heparinok** megelőző dózisban (pl. vérrögök) történő alkalmazása 65

évesnél fiatalabb betegek esetén

- A vérzések kockázata emelkedik.

- **a vérrögök feloldására használt gyógyszerek (trombolitikumok)**, például **sztreptokináz**

- A vérzések kockázata emelkedik.

- **kortizont** vagy **kortizonszerű anyagokat** tartalmazó készítmények (**glükokortikoidok**), kivéve hidrokortizon pótló terápia:

- A vérzések kockázata emelkedik.

- **szelektív szerotonin visszavétel gátlók**, pl. **citalopram, eszitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, szertralin**: a depresszió kezelésére használt készítmények

- A vérzések kockázata emelkedik.

- **digoxin**: egy szívelégtelenség és szívritmus zavar kezelésére használt gyógyszer

- A digoxin vérszintje emelkedik. A digoxin vérszintjének monitorozása szükséges az orvos által, és ha szükséges, a dózis állítása szükséges.

- **a vércukorszintet csökkentő gyógyszerek (antidiabetikumok)**, mint például **inzulin** vagy **szulfonilureák**:

- A vércukorszint monitorozása ajánlott.

- **valproinsav**: egy epilepszia kezelésére használt gyógyszer.

- A valproinsav toxicitása emelkedik.

- **Kombinációk, amelyek alkalmazása megfontolást igényel:**

- **deferazirox, deferoxamin**: a túl sok vas eltávolítására használt gyógyszerek.

- Deferazirox: a gyomor- vagy nyombélfekély és vérzések kockázata nő.

- A deferoxamin és aszkorbinsav használata növelheti a szöveti vas toxicitást, különösen a szívben.

- **Vas és alumínium**: az aszkorbinsav adása növeli a gyomor-bélrendszerből történő felszívódást. Ezt figyelembe kell venni, ha Önnek vesekárosodása van és vaspótló kezelésben részesül vagy alumínium tartalmú antacidokat szed.

- **laboratóriumi eredmények**

- Az acetilszalicilsav és aszkorbinsav nagy dózisban zavarhatja néhány laboratóriumi teszt eredményét, mint például a székletvér vizsgálatot, vagy a májfunkciós teszteket. Tájékoztassa kezelőorvosát, hogy az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát alkalmazza!

- **Az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta egyidejű bevétele alkohollal**

- Kerülje az alkohol fogyasztását, amíg az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát alkalmazza.

- **Terhesség, szoptatás és termékenység**

- Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség

lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

- Terhesség

- **Ne alkalmazza ezt a gyógyszert a terhesség harmadik harmadában (a 24. hetet követően)**, mivel az súlyos veszélyt jelenthet Önre, vagy születendő gyermekére nézve!

- A terhesség első és második harmadában (az első 24 hét alatt) kérje ki kezelőorvosa tanácsát a gyógyszer szedésével kapcsolatban.

- Ha ezt a gyógyszert terhesség alatt mégis alkalmazta, azonnal vegye fel a kapcsolatot kezelőorvosával!

- Szoptatás

- **Az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta alkalmazása szoptatás alatt nem ajánlott**, mivel pezsgőtabletta anyagai átjutnak. Az anyatejbe

- Termékenység

- Ez a gyógyszer egy olyan gyógyszerterápiás csoportba tartozik (ún. nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek, "NSAID"), amelyek a női termékenység zavarát okozhatják. Ez a hatás átmeneti és a készítmény alkalmazásának abbahagyásával helyreáll.

- A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

- Ez a készítmény alkalmanként fejfájást vagy szédülést okozhat. Ne vezessen vagy kezeljen gépeket, amennyiben ezen tünetek valamelyike jelentkezne Önnél!

- Az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta nátriumot tartalmaz

- Ez a készítmény pezsgőtablettánként 473,72 mg (20,61 mmol) nátriumot tartalmaz. Kontrollált nátrium diétán lévő betegek esetében ezt figyelembe kell venni.

- Hogyan kell alkalmazni az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát?

- Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

- Adagolás

- **Szájonát történő alkalmazásra.**

- **A pezsgőtablettát bevétel előtt egy pohár vízben kell feloldani. A pezsgőtablettát a gyomorirritáció csökkentése érdekében nem szabad éhgyomorra bevenni.**

- A készítmény ajánlott adagja:

- Felnőtteknek

- egyszeri adag: 1 pezsgőtabletta

- Az egyszeri adag szükség esetén 4-8 óránként ismételhető.

- maximális napi adag: 3 pezsgőtabletta

- Alkalmazás gyermekeknél és serdülőknél

- Serdülők: 12 éves és annál idősebb

- A legalacsonyabb hatékony dózist kell alkalmazni.

- Az adagolás függ a serdülő testsúlyától. Ez a készítmény csak 53 kg testsúly feletti serdülők esetén alkalmazható. Az életkor csak információ céljából hivatkozott.

- Az ajánlott egyszeri adag: 1 pezsgőtabletta (800 mg acetilszalicilsav/480 mg aszkorbinsav).

- A maximális napi adag nem haladhatja meg a 3 pezsgőtablettát.

- Az Aspirin Plus C Forte (800mg acetilszalicilsav/480mg aszkorbinsav) pezsgőtabletta hatásereőssége nem a legmegfelelőbb serdülők kezelésére. Ezen korosztály részére léteznek egyéb, az acetilszalicilsavat alacsonyabb hatásereősségben tartalmazó készítmények.

- 12 évesnél fiatalabb gyermekek

- Az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta nem alkalmazható 12 évesnél fiatalabb gyermekek esetében. Amennyiben a készítményt véletlenül mégis alkalmazná, úgy kérjük olvassa el a "Tudnivalók az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta alkalmazása előtt" és az "Amennyiben az előírtnál több Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát alkalmazott" pontokban leírtakat.

- 65 éves és annál idősebb betegek és alacsony testtömegű betegek

- A lehetséges kísérőbetegségek miatt a lehető legalacsonyabb hatékony dózist kell alkalmazni. Lásd továbbá a 2. pontban a "Ne szedje az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát" és a "Figyelmeztetések és óvintézkedések" pontokat.

- Csökkent máj- vagy vesefunkciójú betegek, vagy keringési rendellenességben szenvedő betegek

- Az adagok csökkentése vagy az adagolási időközök elnyújtása javasolt az alábbi betegek számára:

- enyhe vagy közepsúlyos máj- vagy veseműködési zavar

- keringési rendellenességek, mint például szívkárosodás vagy jelentős vérzési események

- Ne alkalmazza az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát, ha súlyos vese- vagy májműködési zavara, vagy kezeletlen szív működési zavara van. Lásd a 2. pontban "Ne szedje az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát".

- Az alkalmazás időtartama

- Ne alkalmazza ezt a gyógyszert 3 napnál tovább láz esetén, vagy 3-4 napnál tovább fájdalom esetén, kivéve ha kezelőorvosa kifejezetten ezt javasolta.

- Amennyiben az előírtnál több Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát alkalmazott

- Hagyja abba a kezelést és haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát, ha túladagolásra gyanakszik.

- A túladagolás tünetei a következők lehetnek:

- fülzúgás, hallásvesztés érzése

- izzadás

- hányinger, hányás, hasmenés

- fejfájás

- szédülés

- a vesefunkció gyors romlása

- Gyermekben már akár mindössze 100 mg/kg acetilszalicilsav egyszeri bevétele is végzetes lehet.

- Ha elfelejtette az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát alkalmazni

- Ne alkalmazzon dupla adagot a kimaradt adag pótlására.

- A készítmény használatával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

- Lehetséges mellékhatások

- Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

- **Hagyja abba** az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletták alkalmazását és **azonnal forduljon kezelőorvosához**, vagy keresse fel az Önhöz legközelebb eső kórházat, ha a következő jelek bármelyikét tapasztalja:

- az arc, a nyelv és a légcső duzzanata, amely súlyos légzési nehézséget okozhat, és amely súlyos allergiás reakció tünete (angioödéma)

- gyomorfájdalom, fekete széklet, véres hányás, kávézacc-szerű hányás, amelyek a gyomor vagy a belek vérzésének a jelei

- A mellékhatások a következő gyakoriságokkal jelentkezhetnek:

- **Gyakori:** 10-ből 1 embert érinthet

- a gyomor vagy a belek rendellenességei, úgy mint gyomorégés, hányinger, hányás, emésztési zavarok

- **Nem gyakori:** 100-ból 1 embert érinthet

- a gyomor, a belek vagy a has fájdalma

- csalánkiütés (urtikária), gyógyszerkiütés, viszketés (pruritus)

- **Ritka:** legfeljebb 1000-ből 1 embert érinthet

- a gyomor-bélrendszer gyulladása és fekélye (gyulladás és fekély a

nyelőcső, gyomor vagy belek területén). Ezek a reakciók nem feltétlenül vérzéssel kísérték és az acetilszalicilsav bármely dózisának alkalmazásakor jelentkezhetnek figyelmeztető tünetek nélkül, a kórelőzményben szereplő súlyos gyomor-bélrendszeri esemény nélkül is.

- túlérzékenységi reakciók, úgy mint asztma, orrfolyás, orrdugulás
- **Nagyon ritka:** legfeljebb 10000-ből 1 embert érinthet
- Rejtett vagy nyílt vérzés a gyomorban vagy a belekben (véres hányás, fekete széklet, stb.), amely vashiányos vérszegénységhez vezet. A vérzés kockázata dóziszfüggő.
- a gyomor-bélrendszer fekélyei és perforációja
- a húgysav csökkent kiválasztása, amely köszvényt válthat ki azon betegeknél, akiknél a húgysav
- kiválasztása már eleve alacsony
- **Nem ismert gyakoriságú:** a rendelkezésre álló adatokból a gyakoriság nem határozható meg
- megnövekedett transzamináz (májenzim) szintek, csökkent májműködés
- májsérülés, főleg a májsejtek sérülése
- csökkent vörösvértest szám (vérszegénység) a vérzés következtében
- súlyos glükóz-6-dehidrogenáz hiányban szenvedő betegek esetében a vörösvérsejtek száma csökkent, és a vörösvértestek elpusztultak
- csökkent vérelemezke szám
- alacsony vércukor szint (hipoglikémia)
- bőrreakciók
- túlérzékenységi reakciók, súlyos allergiás reakciók (anafilaxiás reakciók)
- A túlérzékenységi reakciók érinthetik a bőrt, a légutakat, a keringési rendszert a gyomor és a bélrendszert, főleg asztmás betegek esetében. A tünetek lehetnek:
 - szöveti duzzanat a folyadéktöbblet következtében
 - vérnyomásesés
 - zihálás, nehézlégzés
 - szív- és légzési nehézség
 - életveszélyes allergiás sokk reakció
 - kiütés, csalánkiütés, viszketés, súlyos allergiás reakció, ide értve az arc vagy a torok duzzanatát
 - asztmás tünetek, az orr belsejének gyulladása, amely tüszögést, orrfolyást és orrdugulást okozhat
 - vérzések megnyúlt vérzési idővel, úgy mint orrvérzés, fogínyvérzés, a bőr alatti piros pöttyök, a húgy- és ivarszervek vérzései
 - A vérzési kockázat az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta alkalmazásának abbahagyását követő 4-8 napig fennállhat. Sebészeti beavatkozások esetén fokozott vérzési kockázattal kell számolni.

Koponyaűri és gyomor-bélrendszeri vérzések is jelentkezhettek. A koponyaűri vérzések végzetesek lehetnek, különösen idősök esetén.

- súlyos vérzések, agyvérzések, különösen kezeletlen magas vérnyomásos betegek esetében és/vagy véralvadást gátló gyógyszereket (antikoagulánsok) szedő betegek esetében
- Egyes elszórt esetekben ezek akár életveszélyesek is lehetnek.
- Folyadék a tüdőben (nem-kardiogén tüdőödéma) krónikus használat mellett és az acetilszalicilsav túlérzékenységgel összefüggésben
- csökkent veseműködés a vesefunkció gyors romlásáig, az aszkorbinsav következtében vesekövek
- hasmenés a nagy dózisú aszkorbinsav alkalmazásakor
- fejfájás, szédülés, hallásvesztés érzése, fülzúgás, amelyek túladagolás jelei
- Reye szindróma (tudatvesztés vagy abnormális viselkedés vagy hányás) (lásd a 2. pontot "Tudnivalók az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta alkalmazása előtt")

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy, gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V. függelékben található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell az Aspirin Plus C Forte pezsgőtablettát tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A címként feltüntetett lejáratidő után ne szedje ezt a gyógyszert.

A lejáratidő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta

- A készítmény hatóanyagai az acetilszalicilsav és aszkorbinsav.

Pezsgőtablettánként tartalmaz:

- 800 mg acetilszalicilsavat és

- 480 mg aszkorbinsavat
- Az egyéb összetevők:
nátrium hidrogén-karbonát (módosított), citromsav, povidon, vízmentes
kolloid szilícium-dioxid

Milyen az Aspirin Plus C Forte pezsgőtabletta külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Aspirin Plus C Forte 800 mg / 480 mg pezsgőtabletta:

Fehér vagy törtfehér, kerek pezsgőtabletta a tabletták egyik oldalán egy körben elhelyezkedő "BAYER kereszt" jelöléssel.

10 vagy 20 pezsgőtablettát tartalmazó alumínium/papír fóliacsík
kartondobozban.

Nem feltétlenül mindegyik kiegészítés kerül kereskedelmi forgalomba