

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyászati és szakirodalmi adatok igazolják. 24 féle gyógynövényt tartalmaz, mely a hagyományos népi orvoslásban régóta használatos keverék az emésztési zavarok enyhítésére. A keserűanyagok és az illóolajok elősegítik az emésztőnedvek termelődését és az epehólyag ürítését. Az illóolajok megszüntetik a teltségérzést és a puffadást.

### **Mik a hatóanyagok?**

1,38 g zedoária gyökér (*Zedoariae radix*), 1,36 g orvosi angyalgyökér (*Angelicae radix*), 1,36 g manna (*Manna*), 0,70 g mirrha (*Myrrha*), 0,68g bábakalácsgyökér (*Carlinae radix*), 0,50 g tárnicsgyökér (*Gentianae radix*), 0,28 g szerecsendió (*Myristicae semen*), 0,17 g igazi édesgyökér (*Liquiritiae radix*), 0,120 g vidrafűlevél (*Menyanthis folium*), 0,110 g édesnarancs perikarpium (*Aurantii dulcis pericarpium*), 0,047 g orvosi kálmos gyökér (*Calami radix*), 0,046 g kínai csillagánizs termés (*Anisi stellati fructus*), 0,038 g kuraszó perikarpium (*Aurantii curacao pericarpium*), 0,035 g fehérüröm virágos hajtás (*Absinthii herba*), 0,031 g keserű narancshéj (*Aurantii amari epicarpium et mesocarpium*), 0,030 g szegfűszeg (*Caryophylli flos*), 0,02 g örvénygyökér (*Helenii radix*), 0,017 g kubéba termés (*Cubebae fructus*), 0,015 g benedekfű (*Cardui benedicti herba*), 0,015 g gyömbér gyökértörzs (*Zingiberis rhizoma*), 0,014 g galangálgyökér (*Galangae radix*), 0,014 g ökörfarkkoró virágpárta (*Verbasci flos*), 0,013 g ezerjófű virágos hajtás (*Centaurii herba*), 0,006 g illatos cickafarkfű (*Ivae moschatae herba*), 0,005 g nőszirmogyökér (*Iridis radix*) alkoholos kivonata, 0,970 g theriák (*Theriaca*), 0,95 g racém kámfor (*Camphora racemica*) /1000 ml

### **Mit tartalmaz még a Bittner Svédcssepp?**

Készítmény segédanyagai: tisztított víz, alkohol, karamell (E 150 d), invert cukor, glicerin, metil-p-hidroxibenzoát, propil-p-hidroxibenzoát.

Alkohol tartalma 40 v/v%.

### **Mikor ajánlott az alkalmazása?**

Belsőleg: enyhe emésztési zavarok, mint pl. teltségérzet, puffadás, étvágytalanság, és bélrenyheség enyhítésére ajánlott.

Külsőleg: a vérkeringést elősegítő hatása miatt bedörzsölésre és borogatásra alkalmas.

### **Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?**

A készítmény nem alkalmazható bármely komponenssel szembeni túlérzékenység (allergia) esetén. Belsőleg nem szedhető agysérülés, epilepszia és más központi idegrendszeri betegség esetén. Nem ajánlott májbetegeknek és alkoholbetegeknek.

Külsőleg nem alkalmazható bőrbetegségekben és sérült bőrfelületen.

### **Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?**

A készítmény 40 v/v% alkoholt tartalmaz, amely adagonként (1 teáskanál~5ml) 1,5g alkoholnak felel meg.

CUKORBETEGEK figyelmébe: 1 teáskanál (5 ml) készítmény 0,0057 szénhidrátot tartalmaz, mely 0,00048 kenyéregységnek felel meg. Napi max. adag (30 ml) 0,0029 kenyéregységnek felel meg.

### **Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?**

Gyermekek csak külsőleg, 6 éves életkor felett és szülői felügyelet mellett alkalmazhatják.

### **Szedhető-e más gyógyszerekkel együtt?**

Alkohollal kölcsönhatásba lépő gyógyszerekkel egy időben nem javasolt alkalmazni.

### **Várandósság és szoptatás ideje alatt alkalmazható-e?**

Várandósság és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható.

### **Hogyan és milyen adagban kell a készítményt alkalmazni?**

Belsőleg: naponta 2-3 x 1-2 teáskanálnyi (~5ml) készítményt kell hígítatlanul vagy vízzel, gyógyteával hígítva bevenni.

Külsőleg: bedörzsölésre ill. borogatásként

### **Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Bittner Svédcsépp?**

Ez ideig mellékhatás nem ismeretes, de ha Ön bármilyen nem várt hatást észlel, hagyja abba a készítmény használatát. Túlérzékeny egyéneken allergiás tünetek (pl. bőrvörösödés, kiütés, ödéma) előfordulhatnak.

### **Mire kell még ügyelni a Bittner Svédcsépp alkalmazásakor?**

A készítmény alkohol tartalma miatt a közlekedésben való részvétel vagy gépekkel történő munkavégzés során a reakcióidő lelassulhat.

Külsőleg alkalmazva: Borogatásként való használatkor ne alkalmazzon páraakötést és ne melegítse! Gyakori külsőleges alkalmazás esetén az alkohol tartalmú készítmény bőrizgató hatású lehet és bőrszárazságot okozhat.

### **Mennyi ideig szedhető a Bittner Svédcsépp?**

Kúraszerű alkalmazása belsőleg legfeljebb 3 hónapig tarthat. Két kúra között legalább 1 hónap szünet tartandó.

Külsőleg: amennyiben tünetei 5-7 napos kezelést követően nem mérséklődnek ill. nem szűnnek meg, hagyja abba a kezelést és keresse fel orvosát!

### **Mik a túladagolás jelei?**

Amennyiben a készítmény alkalmazása során a bevitel jóval túllépi a javasolt mennyiséget, úgy túladagolásra (alkohol intoxikációra) utaló tünetek jelentkezhetnek.

### **Hogyan kell tárolni?**

A Bittner Svédcséppet legfeljebb 30 °C-on, fénytől védve kell tárolni.

Gyermekektől elzárva tartandó!

**Csomagolási egység:** 50ml / 100ml/ 250ml/ 500ml