

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BRONCHIPRET SZIRUP ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Növényi eredetű hatóanyagokat tartalmazó, hörghurut kezelésére szolgáló készítmény, köptető. Heveny és idült hörghurut fellángolása esetén alkalmazható, amikor fokozott váladékképződés és köhögés áll előtérben.

2. TUDNIVALÓK A BRONCHIPRET SZIRUP ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a Bronchipret szirupot,

- ha Ön allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a készítmény egyéb összetevőjére.
- Így ezt a gyógyszerkészítményt nem kaphatja olyan beteg, akinél a borostyánlevél, a kakukkfű vagy az ajakosvirágúak (Labiatae) közé tartozó egyéb növény, nyírfa, ürömfű, zeller valamely komponense vagy a készítmény bármely egyéb alkotórésze (pl. alkohol) túlérzékenységi reakciót okoz;
- ha Ön egy ritka, örökletes anyagcserezavarban, a fruktóz-intoleranciában (gyümölcscukor-érzékenység) szenved, a készítmény (maltit-tartalma miatt) nem javasolt!

- A Bronchipret szirup fokozott elővigyázatossággal alkalmazható:

4 évesnél fiatalabb gyermekeknél a készítmény alkalmazása nem ajánlott, mivel csupán elégtelen mennyiségű adat áll rendelkezésre a 4 évesnél fiatalabb gyermekekre vonatkozóan.

- Forduljon kezelőorvosához, ha a kezelés első hetében a tünetek nem javulnak, esetleg rosszabbodnak, vagy ha az alábbi tüneteket észleli: nehézlégzés, láz, gennyes vagy véres köpet!

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:

Jelenleg gyógyszerkölsönhatás és egyéb zavaró kombináció nem ismert.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is!

Terhesség és szoptatás:

Terhes nőknél és szoptatás alatt történő alkalmazására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, ezért ezen állapotokban a készítmény alkalmazása nem javasolt.

Kérdéseivel bármely gyógyszer szedése előtt forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre:

A Bronchipret szirup az előírt dózisban alkalmazva nem befolyásolja a járművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

Fontos információk a Bronchipret szirup egyes összetevőiről:

A Bronchipret szirup nyák- és hörgőgörcsoldó hatású, légúti betegségek

kezelésére szolgáló, jól tűrhető növényi hatóanyagokat tartalmazó készítmény. A gyulladás következtében mind akut, mind krónikus hörghurut (bronchitis) esetén többnyire sűrű váladék képződik, amely a légutak nyálkahártyájának természetes öntisztuló mechanizmusát zavarja, ez káros hatású, mert a légúti funkciót - a szervezet oxigénellátását - hátrányosan befolyásolja. A Bronchipret szirupban lévő gyógynövények - a kakukkfű (Thymi herba) és a borostyánlevél (Hederae helices folia) - nyákoldó és enyhén hörgőgörcsoldó hatásúak, amelynek a hörghurut lezajlásának bizonyos szakaszaiban van jelentősége. A váladékot elfolyósító hatás a légutak megfelelő mirigyeinek serkentésével alakul ki.

- Amennyiben orvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra (pl. gyümölcscukorra, fruktózra, maltitra) érzékeny, kérjük a gyógyszer alkalmazása előtt kérje orvosa tanácsát!

- A készítmény 5,5-7% (V/V) alkoholt tartalmaz: 1 ml (=1,23 g) szirupban 0,055 g alkohol van. Alkoholizmusban szenvedők számára a készítmény káros hatású. Az alkoholtartalmat figyelembe kell venni terhes nőknél, illetve szoptató anyáknál, az előírtnál nagyobb dózist alkalmazó gyermekeknél, és *az olyan magas kockázatú csoportoknál, mint amilyenek a májbetegségben, epilepsziában, agysérülésben vagy betegségben szenvedő betegek.*

- *Információ cukorbetegnek:* A szirup egyetlen dózisa átlagosan kevesebb, mint 0,18 kenyéregységnek megfelelő szénhidrátot tartalmaz.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A BRONCHIPRET SZIRUPOT!

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

Ha az orvos másként nem rendel, a Bronchipret szirupot az alábbi táblázat szerint adagolja naponta 3-szor! Az adag kiméréséhez használja a mellékelt műanyag adagoló poharat!

4-6 éves gyermekeknek 3,2 ml

6-12 éves gyermekeknek 4,3 ml

12 év feletti fiataloknak és felnőtteknek 5,4 ml

Használat előtt felrázandó!

A készítményt hígítás nélkül kell bevenni, de a bevétel után lehet egyéb folyadékot fogyasztani (pl. 1 pohár vizet).

A kezelés időtartamát a betegség súlyossága határozza meg. Egyhetes kezelés után sem javuló - esetleg rosszabbodó - tünetek esetén (pl. ha nehézlégzés, láz, gennyes köpet jelentkezik) orvoshoz kell fordulni.

Ha az előírtnál több Bronchipret szirupot vett be

Véletlen vagy szándékos túladagolásról tapasztalatok nem állnak rendelkezésre.

Lehetséges tünetek: gyomorpanasz, hányás, hasmenés.

Javasolt kezelése: tüneti terápia.

Ha elfelejtette bevenni a Bronchipret szirupot:

A soron következő adagolási időpontban ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására!

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

A mellékhatások értékelésére az alábbi gyakorisági kategóriák szerint került sor:

Nagyon gyakori: 10-ből több mint egy betegnél fordul elő

Gyakori 100-ból egynél több, de 10-ből egynél kevesebb betegnél fordul elő

Nem gyakori: 1000-ből egynél több, de 100-ból egynél kevesebb betegnél fordul elő

Ritka: 1000-ből egynél kevesebb betegnél fordul elő

Nagyon ritka: 10 000-ből egynél kevesebb betegnél fordul elő

Nem ismert gyakoriságú: a gyakoriságot a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet megbecsülni.

Immunrendszeri betegségek és tünetek (lásd még "A bőr és a bőralatti szövet betegségei és tünetei" és a "Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek"

Nem ismert gyakoriságú:

Túlérzékenységi reakciók, pl. csalánkiütés, az arc és a száj duzzanata

Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek

Nem ismert gyakoriságú:

Nehézlégzés, a garat duzzanata.

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek

Nem ismert gyakoriságú:

Emésztőrendszeri rendellenességek, pl. görcsök, hányinger és hányás

A bőr és a bőralatti szövet betegségei és tünetei

Ritka:

Bőrkiütés

Túlérzékenységi (allergiás) reakció bekövetkeztekor a Bronchipret szirup alkalmazását azonnal fel kell függeszteni, és többet nem lehet alkalmazni.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét!

5. HOGYAN KELL A BRONCHIPRET SZIRUPOT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25 °C-on, az eredeti csomagolásban tárolandó.

Felbontás után 6 hónapig tartható el.

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felh. :) után ne alkalmazza a Bronchipret szirupot.

A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelessé vált gyógyszereit miként semmisítse meg! Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Bronchipret szirup?

- A készítmény hatóanyaga(i) 1 g szirupban:

150 mg kakukkfűkivonat (Extractum Thymi herbae fluidum) és 15 mg borostyánlevél-kivonat (Extractum Hederae heliis folii fluidum)

- Egyéb összetevők:

Maltit-szirup, kálium-szorbát, citromsav-monohidrát, tisztított víz, alkohol 5,5-7% (V/V); (1 ml szirup 0,055 g alkoholt tartalmaz. 1 ml = 1,23 g).

Milyen a Bronchipret szirup külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Világosbarna színű, aromás illatú, édes ízű, alkoholos-vizes folyadék: szirup.

Műanyag adagoló pohárral ellátott, fehér garanciazáras csavaros kupakkal és kiöntőbetéttel lezárt barna üveg, dobozban. Egy üveg egy dobozban.

Kiszerezések: 50 ml, 100 ml