

MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CHOLAGOL BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

- A készítmény hatóanyagai főleg növényi eredetűek. Elsősorban az epe termelődését és kiválasztódását serkentik. Ezen kívül a Cholagol belsőleges oldatos cseppek enyhíti az epeutak simaizmainak görcsét, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő és emésztést elősegítő hatása (enyhe hashajtó, szélhajtó hatása) van.

- A készítmény kiegészítő kezelésként alkalmazható epekő, krónikus epehólyag-gyulladás esetén, epeúti műtétek utáni, valamint idült májbetegség esetén jelentkező emésztési zavarokban. A készítmény alkalmazhatóságát beszélje meg kezelőorvosával.

- A Cholagol belsőleges oldatos cseppek felnőtteknél és serdülőknél 12 éves kor felett is alkalmazható.

- Serdülőknél a készítmény csak orvosi utasításra alkalmazható.

- Ha a betegség tünetei nem enyhülnek három napon belül, vagy az állapot romlik, illetve bármilyen mellékhatás vagy szokatlan reakció jelentkezik, a gyógyszer alkalmazásának folytatását beszélje meg kezelőorvosával.

- Ha további információkra van szüksége, forduljon kezelőorvosához.

- TUDNIVALÓK A CHOLAGOL SZEDÉSE ELŐTT

- Ne alkalmazza a Cholagol belsőleges oldatos cseppeket:

- ha allergiás a Cholagol hatóanyagaira vagy egyéb összetevőjére.

- Jelezze orvosának, ha korábban bármelyik gyógyszerrel kapcsolatban szokatlan tüneteket tapasztalt.

- máj és epeutak heveny (akut) gyulladása esetén,

- ha súlyos veseelégtelenségben szenved,

- 12 év alatti gyermekeknél,

- 17 év alatti serdülők, akiknél az akut vírusfertőzést magas láz kíséri

- terhesség és szoptatás idején.

- A Cholagol belsőleges oldatos cseppek fokozott elővigyázatossággal alkalmazható

- ha a tünetei nem múlnak el 3 napon belül, illetve állapota romlik, vagy bármely mellékhatás illetve olyan mellékhatás lép fel, amely nincs említve ebben a tájékoztatóban, beszéljen kezelőorvosával.

- 17 év alatti gyermek, akiknél az akut vírusfertőzést magas láz kíséri (pl. bárányhimlő, influenza), hajlamos lehet a Reye tünetegyüttes kialakulására.

A Reye szindróma kialakulására főleg a vírusfertőzés tüneteinek csökkenése után lehet számítani. A klinikai képbe beletartozik a súlyos hányás, fejfájás és tudatzavarok. Ha ilyen tünetek lépnek fel azonnal értesítse orvosát.

- A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

- Beszélje meg kezelőorvosával a Cholagol belsőleges oldatos cseppek és egyéb gyógyszer egyidejű alkalmazását.

- Terhesség és szoptatás

- Nem szedhet Cholagol belsőleges oldatos cseppeket ha terhes, vagy szoptat.

- Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

- A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

- A Cholagol belsőleges oldatos cseppek nem befolyásolja sem a figyelmet, sem a koncentrációs képességeket.

- Fontos információk a Cholagol egyes összetevőiről

- Vegye figyelembe, hogy a gyógyszer 11, 4 v/v% etanolt tartalmaz.

- 3. HOGYAN KELL SZEDNI A CHOLAGOL BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEKET!

- Általában az epeutak hosszú távú betegsége és az epehólyagon végzett műtétek után felnőtteknek és serdülőknek 12 éves kor felett a javasolt adagja 5-10 csepp naponta háromszor. A bevett adagok között legalább 5 órának kell eltelnie. Epehólyaggörcs esetén egyszeri adagban 20 csepp alkalmazható.

- Idősek és veseelégtelenségben szenvedők részére

- Időseknél a vesefunkció csökkent működése miatt az alacsonyabb adag javasolható. Csökkent veseműködésnél is az alacsonyabb adag javasolt.

- A gyógyszert cukorra kell csepegtetni, és lehetőleg étkezés előtt fél órával kell bevenni. Gyomorégésre való hajlam esetén étkezés alatt, vagy azt követően is alkalmazható.

- A gyógyszeres üvegből függőlegesen, fejjel lefelé kell csepegtetni.

- Ha az előírtnál több Cholagol belsőleges oldatos cseppeket vett be

- Túladagolás esetén, vagy ha kisgyermek véletlenül lenyeli, és rossz közérzet, hasi fájdalom vagy görcs, hányás és hasmenés jelentkezik, keresse fel kezelőorvosát.

- Ha elfelejtette bevenni a Cholagol belsőleges oldatos cseppeket

- Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott oldat pótlására.

- 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

- Mint minden gyógyszer, így a Cholagol is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

- A gyógyszer rendszerint jól tolerálható. Kivételes esetben böfögés, rossz közérzet, gyomorégés fordulhat elő.

- Jelentett nemkívánatos mellékhatások
- Emésztőrendszeri betegségek és tünetek:
- Gyomor nyálkahártya gyulladás (bőfögés, hányinger és gyomorégés)
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy

- 5. HOGYAN KELL A CHOLAGOL BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEKET TÁROLNI!

- Legfeljebb 25 °C-on fénytől védve tárolandó. Nem fagyasztható. Hűtőszekrényben nem tárolható.
- A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni
- A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.
- A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgőssé vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

- 6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- Mit tartalmaz a Cholagol belsőleges oldatos cseppek
- a készítmény hatóanyagai 1ml oldatban: frangulaemodin 0,9 mg, kurkumin 2,25 mg, magnézium-szalicilát 18 mg, eukaliptuszolaj 192,6 mg, borsosmentaolaj 360 mg. A készítmény 1ml-e 30 cseppnek felel meg.
- egyéb összetevők: levomentol, 96%-os etanol, natív olívaolaj

-

Milyen a Cholagol készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás:
Cseppentővel és védőkupakkal ellátott barna üvegbe töltött vöröses sárga, enyhén fluoreszkáló, aromás szagú folyadék
Az üveg 10 ml illetve 25 ml oldatot tartalmaz.