

1. Milyen típusú gyógyszer a Digifungin külsőleges por és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Digifungin külsőleges por hatóanyaga, a tolnaftát, egy gombaellenes szer, amely meggátolja egyes gombák szaporodását és elpusztítja azokat.

A Digifungin külsőleges por a következő betegségekben alkalmazható:

- ? ujjak közötti gombás fertőzés okozta hámlás,
- ? szőrzettel borított testrészek felületi gombás fertőzése,
- ? hajlatok gombás fertőzése okozta kipállás, lágyéktáji gombás fertőzés,
- ? felületes, lencsényi barna foltokat okozó gombás bőrfertőzés,
- ? gombás ekzéma,
- ? egyéb felületi gombásodások,
- ? bőséges verejtékezésben szenvedők hajlati gombás fertőzéseinek megelőzésére és utókezelésére.

2. Tudnivalók a Digifungin külsőleges por alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a Digifungin külsőleges port:

- ha allergiás a hatóanyagra a (tolnaftátra) vagy gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- ha a gyógyszer használata során a kezelt bőrfelületen viszketést, bőrpírt vagy bármi szokatlant észlel.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Ez a gyógyszer a körömgombásodásra nem hat.
- **Egyéb gyógyszerek és a Digifungin külsőleges por**
- Bizonyított gyógyszerkölsönhatások nem ismertek.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.
- **Termékenység, terhesség és szoptatás**
- A készítmény használatának terhesség és szoptatás esetén ellenjavallata nincs, az adagolás módosítása nem szükséges.
- **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**
- A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre nem ismert.

3. Hogyan kell alkalmazni a Digifungin külsőleges port?

- Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy

az Ön kezelőorvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét,

- A napi kezelések számát és a kezelés idejét a fertőzés típusa és súlyossága szabja meg.

- A készítmény ajánlott adagja

- Amennyiben kezelőorvosa másképpen nem rendeli, általában szappanos, melegvizes lemosás után a szárazra törölt, kezelendő bőrfelületre kell hinteni, naponta kétszer.

Csak külsőleg alkalmazható!

Egyéb alkalmazással kapcsolatos információk

- Felmaródott bőrfelületre is alkalmazható.

- Lábgombásodás esetén a cipő és a zokni is beszórandó.

- Lehetőleg kérjen tanácsot és csak addig használja a szert, amíg orvosa javasolja.

- Ha 1-2 napon belül tünetei nem enyhülnek, feltétlenül forduljon orvoshoz.

Ha elfelejtette alkalmazni a Digifungin külsőleges port:

Ha elfelejti gyógyszerét alkalmazni, amint teheti, pótolja a kimaradt adagot. Amennyiben erre nincs lehetősége, a soron következő előírt adagolási időpontban folytassa a kezelést, de ne alkalmazzon kétszeres adagot.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Ritka mellékhatás (1000 ember közül legfeljebb egynél jelentkezik):

- bőrirritáció,

- bőrgyulladás, melyet a bőrrel érintkezésbe kerülő anyag vált ki (kontakt dermatitisz),

- bőrviszketés,

- enyhe helyi irritáció a következő esetekben előfordulhat:

- ha felmaródott bőrön alkalmazzák vagy,

- ha a gombák (pl. dermatofiton) által okozott fertőzéshez egyéb fertőzés is társul,

- ha nagy bőrfelületen történik a kezelés.

- érzékenységet kiváltó hatása elhanyagolható.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V. függelékben található elérhetőségeken

keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a Digifungin külsőleges port tárolni?

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ne alkalmazza ezt a gyógyszert, ha színében, szagában változást észlel. Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba,

Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Digifungin külsőleges por

- A készítmény *hatóanyaga* 20 mg tolnaftát 1,0 g külsőleges porban.
- *Egyéb összetevők*: levendulaolaj, vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, cink-oxid, nehéz kaolin, könnyű bázisos magnézium-karbonát, talkum.

Milyen a Digifungin külsőleges por külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Fehér, vagy csaknem fehér, levendula illatú, finom por.

Csomagolás:

Kb. 50 g por fehér műanyag (PP) szórótartályban, amely fehér műanyag (PP/PE) szórófeltéttel és kupakkal van ellátva.

Egy tartály tartalma 50 g. 1 tartály dobozban.