

Homeopátiás gyógyszerkészítmény.

Növényi-, állati- és ásványi eredetű anyagok, valamint nozóda felhasználásával készült orrcsepp.

**Összetétel:**

100 g oldat hatóanyagtartalma:

Euphorbium	D 4	1,0 g
Hydrargyrum bijodatum	D 8	1,0 g
Mucosa nasalis suis	D 8	1,0 g
Hepar sulfuris	D 10	1,0 g
Argentum nitricum	D 10	1,0 g
Sinusitis-nozóda	D 13	1,0 g
Pulsatilla pratensis	D 2	1,0 g
Luffa operculata	D 2	1,0 g

Tartósítószerként benzalkonium-kloridot tartalmaz.

**Javallatok** A szervezet öngyógyító törekvésének serkentése különböző eredetű idült rhinitis, rhinitis sicca esetén. Krónikus sinusitisek. Allergiás eredetű náthában (szénanátha) az orrlégzést megkönnyíti. Alkalmazható ozaena kiegészítő kezelésére.

**Adagolás** A dózisdagoló szórófej egyszeri megnyomásával 1 adag permetezhető ki.

Ha az orvos másképp nem rendel, szokásos adagjai:

Felnőtteknek naponta 3-5 alkalommal 1 vagy 2 adagot juttatunk mindkét orrlyukba.

Gyermekeknek 6 éves kor alatt naponta 3-4 alkalommal 1 adagot juttatunk mindkét orrlyukba.

A készítmény csecsemőknek is biztonságosan alkalmazható.

A panaszok enyhülésével az adagolás gyakorisága csökkentendő.

**Figyelmeztetés** Az alkalmazás kezdetén jellemző módon sor kerülhet a panaszok átmeneti erősödésére.

Terhesség vagy szoptatás esetén a kezelés megkezdése előtt ki kell kérni a kezelőorvos tanácsát.

Minden nem várt reakciót jelezen orvosának.

A készítmény első használata előtt az aeroszolt a szabad légtérbe permetezzük a szórófej (ismételt) lenyomásával. Ezután az előírt adagokat juttatjuk mindkét orrlyukba.

Minden alkalmazás után a védőkupakot helyezzük vissza a dózisdagoló szórófejre.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásával egyidejűben ( $\pm$  1/2 óra) tilos illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkát szopogatni és nem szabad intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Amennyiben a panaszok a kezelés ellenére fennállnak, ismételt orvoshoz kell fordulni.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

*Eltartása:* szobahőmérsékleten (15-25 °C).

**Megjegyzés** Vény nélkül is kiadható.

**Csomagolás** 20 ml.