

. Milyen típusú gyógyszer a Faringopront szopogató tabletták és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A gyógyszer a kórokozók ellen védő, helyileg alkalmazható fertőtlenítőszer és fájdalomcsillapításra alkalmas helyi érzéstelenítőszer tartalmaz.

Ez a gyógyszer enyhe (lázal nem járó) torokfájás, szájfekélyek és egyéb kisebb szájüregi elváltozások kezelésére javallt. A készítmény felnőttek és 6 évesnél idősebb gyermekek és serdülők kezelésére használható.

2. Tudnivalók Faringopront szopogató tabletták alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a Faringopront szopogató tablettát

- ha allergiás a helyi érzéstelenítőszerre, a klórhexidinre, vagy gyógyszer (6. pontban felsorolt) bármely egyéb összetevőjére.
- 6 éves vagy ennél fiatalabb gyermekek esetében.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A szopogató tabletták hatására, a torokban kialakuló érzéstelenítés miatt fennáll a véletlen félrenyelés (étkezés közben hirtelen köhögési roham lép fel és úgy érezheti, hogy a falat a légcsövembe jutott - aspiráció) veszélye, ezért:

- 6-12 éves gyermekeknek körültekintően kell alkalmazni.
- a készítményt **nem szabad** étkezés vagy folyadékfogyasztás előtt bevenni.

Ezt a készítményt nem célszerű hosszú időn keresztül (5 napnál hosszabb ideig) használni, mert megváltoztathatja a szájüreg és a garat természetes baktériumflórájának összetételét és ez a baktérium- vagy gombafertőzés tovaterjedésének kockázatával jár:

- Torokfájás: ha belázasodik, a köpete gennyessé, a nyelés nehezített/fájdalmassá válik, ill. 5 napos kezelés után sem javul, sőt súlyosbodik az állapota, **FORDULJON ORVOSHOZ!**
- Szájfekélyek és egyéb kisebb szájüregi elváltozások: kiterjedt elváltozás esetén, vagy ha tovaterjed az elváltozás, netán láz jelentkezik, **AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ!**

Ha a kezelés elkezdésétől számított **5 napon belül** nem érez javulást, vagy tünetei rosszabbodnak, esetleg újabb tünetek jelentkeznek, egyéb kezelésre is szüksége lehet, ezért **kérje ki kezelőorvosa tanácsát.**

Ne használjon egyidejűleg többféle helyileg (száj/torok) ható, érzéstelenítő hatású készítményt, mert súlyos központi idegrendszeri (akár görcsrohamok is), illetve szív-érrendszeri mellékhatások (pl. ritmuszavar) léphetnek fel.

A nyelv barna elszíneződése: veszélytelen és a kezelés befejeztével eltűnik.

A fogak és a szilikát illetve kompozit fogtömések barna elszíneződése: nem jelent tartós elszíneződést és napi rendszeres fogmosással megelőzhető.

Egyéb gyógyszerek és Faringopront szopogató tabletták

A Faringopront szopogató tabletták alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészeivel.

Ez a gyógyszer helyileg ható fertőtlenítőszer (klórhexidin) tartalmaz. Ez a hatóanyag más készítményekben is előfordulhat. Ne használjon egyidejűleg többféle ezekből a gyógyszerekből és ne lépje túl a készítmény javasolt adagját (lásd "Adagolás és alkalmazás" címmel).

A Faringopront szopogató tabletták egyidejű alkalmazása étellel és itallal

A készítményt nem szabad étkezés vagy folyadékfogyasztás előtt bevenni. A szopogató tabletták alkalmazása után az étkezést és az ivást 1-2- órán keresztül kerülni kell.

Terhesség és szoptatás

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészeivel.

Terhesség idején - mivel az alkalmazással kapcsolatban nincs elegendő tapasztalat - a készítmény használata nem javasolt.

A szoptatás időszakában a készítmény használata nem javasolt, mivel az újszülöttekre vonatkozó kockázat nem zárható ki..

A Faringopront szopogató tabletták cukrokat (glükózt és szacharózt) tartalmaz

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel kezelőorvosát, mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert.

Cukorbetegeknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a készítmény tablettáknént 2,5 g cukrot tartalmaz.

A Faringopront szopogató tabletták kószil vörös A (E124) színezőanyagot tartalmaz, mely allergiás reakciókat okozhat.

3. Hogyan kell alkalmazni a Faringopront szopogató tablettát?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak vagy az Ön kezelőorvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészt.

Kizárólag felnőttek és 6 évesnél idősebb gyermekek és serdülők kezelésére használható.

A készítmény ajánlott adagja

Felnőttek és 15 évesnél idősebb serdülők: 24 óra alatt 4×1 tabletták, elszopogatva.

6-15 év közötti gyermekek és serdülők: 24 óra alatt 2-3×1 tabletták, elszopogatva.

Alkalmazás után az étkezést és az ivást 1-2 órán keresztül kerülni kell. A készítmény egyes adagjainak alkalmazása között legalább 2 órának kell eltelnie.

Ez a készítmény legfeljebb 5 napig alkalmazható egyhuzamban.

Amennyiben állapota romlik, illetve nem javul 5 napon belül, Keresse fel KEZELŐORVOSÁT

Ezt a készítményt nem célszerű hosszú időn keresztül (5 napnál hosszabb ideig) használni, mert megváltoztathatja a szájüreg és a garat természetes baktériumflórájának összetételét.

Ha az előírtnál több Faringopront szopogató tablettát alkalmazott

- kis mennyiség nem okoz mellékhatásokat

- nagy mennyiség (sok tablettát) túlfogyasztása esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz vagy keresse fel a kórházi ügyeletet.

A klórhexidin mellékhatásai nem valószínűek, előfordulhat emésztési kellemetlenség, égő érzés a szájban vagy torokban, enyhe mozgáskoordinációs zavar vagy májrendellenességek.

A tetrakain nyelvmerevséget vagy nyelési nehézséget, idegrendszeri zavarokat (idegesség, látási zavarok, görcsrohaok), szív- és érrendszeri rendellenességeket (magas vérnyomás, ritmuszavarok) és methemoglobinémiát (az oxigénszállításért felelős hemoglobin molekula rendellenes formájának felszaporodása a vérben) okozhat

Ha elfelejtette bevenni a Faringopront szopogató tablettát

Ne vegyen be kétszeres mennyiséget a kihagyott adag pótlására.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, melyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A feltüntetett mellékhatások gyakorisága nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg):

- **allergiás reakciók**, mint például bőrkiütés, csalánkiütés, hirtelen kialakuló duzzanat az arcon, a szemkörnyékén, az ajkakon, a nyelv, a garat vagy a gége területén (ezekben az esetekben nyelési vagy légzési nehezítettséget is okozhat), a kezeken és lábakon, valamint akár súlyos, életveszélyes anafilaxiás sokk (gyengeség, ájulásérzés, keringés-összeomlás) is jelentkezhet: ha ezen tünetek bármelyike fellép, **azonnal hagyja abba a gyógyszer alkalmazását** és keresse fel kezelőorvosát vagy a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát;

- a nyelv és a garat átmeneti zsibbadása;

- véletlen félrenyelés (étkezés közben hirtelen köhögési roham lép fel és úgy érezheti, hogy a falat a légcsövébe jutott) esetén ajánlatos abbahagyni a kezelést és orvoshoz fordulni;

- a nyelv barnás elszíneződése: ez a jelenség ártalmatlan és a kezelés

befejezés után megszűnik;

- a fogak vagy a szilikát, ill. kompozit fogtömések barnára szineződhetnek, mely a napi rendszeres fogmosással megelőzhető.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V. függelékben található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a Faringopront szopogató tablettát tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Faringopront szopogató tabletta?

- A készítmény *hatóanyagai*: klórhexidin-diglükonát és tetrakain-hidroklorid. Egy szopogató tabletta 3 mg klórhexidin-diglükonátot és 0,2 mg tetrakain-hidrokloridot tartalmaz.

- *Egyéb összetevők*: kosnil vörös A (E 124), "Pulmoral" aroma (LE 1444), ammónium-glicirrizát, "mezei pipacs" aroma, aszkorbinsav, glükóz, szacharóz.

Milyen a Faringopront szopogató tabletta készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

A Faringopront szopogató tabletta kerek, vörös színű, először frissítő, majd keserű ízű szopogató tabletta.

Csomagolás:

24 db szopogató tabletta PVC/PVDC//Al buborékcsomagolásban és dobozban.