

## **1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A GYNOXIN 2% HÜVELYKRÉM ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?**

A Gynoxin 2% krém a hüvely és a külső nemi szervek gombás fertőzéseinek (amelyek járhatnak a külső nemi szervek, ill. a hüvely gyulladásával vagy fertőzőes eredetű folyással) kezelésére alkalmas.

## **2. TUDNIVALÓK A GYNOXIN HÜVELYKRÉM ALKALMAZÁSA ELŐTT**

### **Ne alkalmazza a Gynoxin hüvelykrémet**

- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely összetevőjére,
- a hatóanyag hüvelyen át történő felszívódása ugyan igen csekély mértékű, ennek ellenére alkalmazása terhesség és szoptatás alatt nem javasolt.

### **A Gynoxin fokozott elővigyázatossággal alkalmazható**

- ha huzamosabb ideig használja, mert a tartós alkalmazás túlérzékenységet okozhat.

Ilyen esetben a készítmény alkalmazását abba kell hagyni, és orvoshoz kell fordulni a megfelelő terápia megbeszélése céljából.

### **A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek**

Gyógyszerkölcsonhatások nem ismertek.

### **Terhesség és szoptatás**

A fentikonazol bőrön, ill. nyálkahártyán keresztül csak kismértékben szívódik fel, ennek ellenére alkalmazása terhesség és szoptatás alatt nem javasolt.

### **A készítmény hatása a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre**

Nem ismert ilyen hatás.

## **3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A GYNOXIN HÜVELYKRÉMET?**

Kb. 5 g krémet kell egy-egy alkalommal a mellékelt adagoló segítségével mélyen a hüvelybe juttatni. A készítményt a mosható és többször használható adagoló felhasználásával kell alkalmazni este lefekvéskor és -szüksége esetén - reggel is.

A visszafertőződés elkerülése céljából a partnernél a hímvessző makkját és a fitymát (előbört) egyidejűleg **Lomexin** krémmel kell kezelni.

A hüvelykrémet az alábbiak szerint kell alkalmazni:

1. Csavarja az adagolót a tubusra a kupak helyére.
2. Finoman nyomja meg a tubus alsó végét, hogy megtöltse az adagolót. Ha bizonyos mérvű ellenállást érez a dugattyún, finoman húzza ki azt. Ha az orvos másként nem rendel, az adagolót teljesen meg kell tölteni.
3. Távolítsa el az adagolót a tubusról, a tubust azonnal zárja le a kupakkal.
4. Fekvő helyzetben, felhúzott és szétnyitott térdekkkel finoman vezesse be az adagolót a hüvelybe olyan mélyre, amennyire csak lehet. Nyomja teljesen végig a

dugattyút. Ezt

követően húzza ki az adagolót a dugattyú érintése nélkül.

Az adagolót minden használat után gondosan meg kell tisztítani meleg vízzel és szappannal.

Ha az orvos bizonyos okokból az adagoló sterilizálását tanácsolja, akkor az orvos utasítását kell követni. Nem szabad 50 °C-nál melegebb vizet alkalmazni, sem szerves oldószert. Tisztítás után az adagolót meg kell szárítani és tartójába vissza kell helyezni.

### **Ha az előírtnál több Gynoxin hüvelykrémet alkalmazott**

Legfeljebb fokozódnak az esetleges mellékhatások.

### **Ha elfelejtette alkalmazni a Gynoxin hüvelykrémet**

A soron következő alkalmazásnál csak a szokott adagot helyezze fel, ne alkalmazzon kétszeres adagot.

## **4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK**

Mint minden gyógyszer, így a Gynoxin 2% hüvelykrém is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A Gynoxint a bőr és a nyálkahártya általában jól tűri. Enyhe, átmeneti bőrpír vagy a hüvelybe való felhelyezéskor enyhe égő érzés csak kivételes esetekben jelentkezik, és általában gyorsan meg is szűnik.

Az útmutatás szerinti alkalmazás esetén a Gynoxin csak kismértékben szívódik fel, így az általános hatások kizárhatók.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

## **5. HOGYAN KELL A GYNOXIN HÜVELYKRÉMET TÁROLNI?**

Legfeljebb 30 °C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza a Gynoxin hüvelykrémet. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgőssé vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## **6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

### **Mit tartalmaz a Gynoxin 2% hüvelykrém?**

- A Gynoxin 2% hüvelykrém hatóanyaga 20 mg fentikonazol-nitrát 1 g hüvelykrémekben.

- Egyéb összetevők: propilén-glikol, hidrogénezett gyapjúviasz, mandulaolaj, zsírsavak makrogol-észterei (Xalifin 15), cetil-alkohol, glicerin-monosztearát, nátrium-edetát, tisztított víz.

**Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?**

1x78 g fehér, homogén krém laminált alumíniumtubusba töltve, LDPE csavaros kupakkal lezárva.

1 tubus + 1 PE/PP adagoló dobozban.